

**DE RHACHITIDE
DISSERTATIO
INAUGURALIS
CLEMENTIS
ORSETTI...**

Clemente Orsetti



DE
SHAGITIDE
Dissertatio Inauguralis
CLEMENTIS GREGGI
PARENTINI



PATAVI
TYPIS PENABE
MDCCCXLII



Fasc. 11111111

Denominatio et Definitio morbi.

Rhachitis (a graeco nomine *ῥαχίς*, *spina dorsal*) praefuse designat morbum, qui principalem suum impetum dirigit in spina dorsalem.

Est morbus reproductivis qualitative victus, qui in deficiente muscularum, ligamentorum, cartilagineum utrumque nutritione consistit, cum abusu horum partium mollium (quae dependet vel a minori calcia vel a maiori glutinis copia) incedit, simulque functiones harum organorum varia ratione perturbata exhibet.

Divisio Rhachitidis.

Dividunt rhachitidem in hereditariam, congenitam, sequitam et endemicam. Diversam autem offert imaginem, a gradu et tempore quo durat repetendam.

Plurimi auctores eam dividunt in perfectam et imperfectam; haec tanquam exordium morbi considerata, illa syndromen symptomatum rhachitidis conventionalem completitur.

Stoll eam dividit respectu epidemias annuas, cui rachitidem subiectam habuit.

Galenus autem in simplicem, absque alio vicio laedentem et complicatam.

Hypotyposis.

Rachitidis definitione jam prius data, fusiori nunc hujus morbi descriptione adhuc opus erit.

Una cum prima definitione hic morbus plerumque apparet, rarissime ante nonam aetatem, vix aliquando post biennium vitae; hinc neonatorum et triennium exentes non adeo petere vices et adultis rarissime laesatos. Observantur quidem saepius et in adultis fragilitas et mollior osium, sed hoc restantur ex aliis momentis casualibus, ac quae rachitidem producant.

Quam autem tempus apparitionis et decursum rachitidis coincidat cum tempore evolutionis osium, cartilagineum, ligamentorum et musculorum, laesae hae non parvae, magnum in functione harum partium turbas, omni jure illi tribui.

Patientes, hoc morbo laborantes, proprio habitu, rachitico dicto, sunt notati; sunt tumolenti et morosi; caput pergendum, ac si hydrocephalus advenet, cum otitibus acris utentibus. Facie parva, pallida. Dentes multis cum difficultatibus erumpunt, brevissime nigrescunt,

eroduntur, marcescunt, cadunt. Oculi nunc nidos acri dilatant pupillas, et caeruleis annulis tandemque saepe palpebris septantur. Appetitus modo depressus, modo illaesus, modo in voracitatem verius; halitus foetet, lingua sparcitur, et frequentes sunt roctus et materiae, ut plurimum acidae, vomitus.

Vasa capitis solito capaciora pro signo pathognomonico huius morbi habetur. Collum tenue, marcidum, quo fit ut caput ipsum non nisi difficulter erectum servetur, quoniam muscoli maridi flaccidique non sufficiunt ad sustentandum tantum pondus, sed caput potius in unam alteramve latus, antecavam vel retrocavam versus inclinet. Thorax quoad figuram magnopere titilatur, evanescit clavicularem et costarum arcus naturalis, pectus in regione sterni elevatur, in lateribus e contra compressum reperitur atque angustatum. Glandula thymus incrassata; oritur dyspnoea una cum aliis respirationis difficultatibus. Abdomen interdum valde extensum, quod non a repletionis intentionem sed ab emphyasi hepatis et lienis dependet. Alvus mox tarda, mox diarrhoeica. Urinae mucoae, turbidae, majori copia calcis phosphoricae acidae impraegnatae. Cutis turgere apollatur, flaccescit, rugat (facies scallia) et sudore continuo madet. Plicae autem, in quas rugat, praecipue debet massae ipsi solutae, qui, omni pinguedine orbiati, summopere maridi et relaxati nec non impotentes repe-

riuntur. Clara denique morbi imago habetur ex systematicis casui symptomatibus, forma mutati et mixtionis, quarum quatuor, hac praevalente mollitie, diversis in partibus diversimode manifestatur. De dentium mutationibus jam loquuti sumus. In extremitatibus autem emollita osium capita tantescunt et crassiora fiunt, ita ut ignotis duplicis compareant et facile sponte laxentur. Dolor est exiguus, cutis ambiens vix adhucdum coloris; hancque mutationem primo atque intensissime patiuntur epiphysae osium extremitatum superiorum et inferiorum; deis autem et articulationes reliquorum osium cylindricorum in compressionem trahuntur. Sed morbus hic non solum epiphysas, sed et corpus horum osium adgreditur, quod nunc extenuatur et elongatur, nunc intumescit pariter ut ganglia venae, mollescit et abbreviatur, dissecis subiens curvaturas, ut rursus et valges inde deriveret expectent.

Pectoris structuram etiam multiforme perturbatur et in quantum haec conferant clarioribus et ceteris jam mentionis. Sed et columna vertebralis in compressionem trahitur, et modo brevior fit, ut grande caput later scapulae subsideat, modo antrotram flectitur (lordosis) modo retrotram (kyphosis) modo in latera (scoliosis).

Facile nunc patet sub his circumstantiis diversas functionum lesiones, etiam atropas et paralyses oriri.

Quae innominata pariter vario modo quoad formam et structuram alienantur, unde pelvis fit angusta, quae in feminis partus reddi difficilem vel impossibilem. Quam inspicuntur ossa, apparent gelatinosa et pressioni facile cedunt.

Ingressum infantem rachiticorum semper summe vacillans reperitur, et si ante morbum exortum ingrediendi adhuc impar fuerit infans, hanc etiam functionem non prius incipit alii morbo soluto; infans autem, qui ante morbum hanc ingrediatur, amittit hanc facultatem morbo lachante.

Quod mentis facultates attinet, in aliis ad stupiditatem deprecata (cretinismus), in multis ultra quam per aetatem esse referunt, ipsi-que plebei intellectus quandoque proe sapientia non posse valere et adolescere in proverbio habent.

Complicationes.

Non facile datur morbus infantilis, quorum hucusque nondum complicata rachitis observata sunt; sed inter omnes hos morbo proe aliis morbis sibi diligit scrofulam et helminthiasin, quorum deinceps praesentia ex symptomatibus, cuiusvis aetatis peculiariter convenientibus, facile dignoscitur.

Decursus.

— Rachitidis decursus est lentus, chronicus, per annos durat aequae cum anni temporibus

inbit vicissitudines. Discrepant quidem auctores de duratione ejus, sed ex generalibus observationibus edocemur, eandem nunquam ultra septimum vitae annum prolongari, nisi cum forte cum aerofila confundas; aut mutationes permanentes per morbum positas, cum morbo ipso equiparare velis.

Rachitis.

Rachitis, ut quivis alius morbus, aut in sanitatem aut in mortem, aut in alios terminatur morbos. Raritas autem directo modo lethalis evadit, ac plerumque alii, in quos vertitur, morbi vitae insidias struunt. Hi morbi oriuntur, ex multifaria oeconomicae vitalis turba, per rachitidem positam, et quam maxime in sanguinis circula et respiratione diversissime locis conspicuis, suntque praecipui: hydrocephalus, asthma, inflammatio pulmonum, horumque lacerationes et excoerationes, hydrothorax, paralysis etc.

Neuroscopia.

In cadaveribus rachitide peremptorum sanitas rigor tardius aut nunquam inaequalitur, sanguis tenuis non abit in coagulatum, crassioris quantitas minor, et calor diu servatur. Laxitas muscularum est insignis. Quibus, praeter deformitatem et flexibilitatem, mollities adeo in-

signis, ut cutis acidi possint. Chondri in ossibus detenerent ossis phosphoricæ inopiam cum glutinis abundantia. Vasa venosa, præcipue meningum (aranea aperta), turgidiora, ipsam oculorum, non mollia, non vero inundata deprehenditur. Glandulae lymphaticae totius corporis præcipue autem cicerentis sunt tumidae, induratae. Etiam in cavo pectoris multa invenimus abnormia, pleura pulmonibus accreta, hinc materia viscida indurati, scirrhusi, ulcerati, nodosi, part, vero aut sanguinis stagnati. In abdomine: hepae, pancreas, lien, vesiculae acuta et constrictive solidioris. Secreta bily pallida et aquosa observatur. Intestina fistibus distensa, sæpe etiam colluvies mucosa vermibus habitata in his deprehenditur.

Aetiology et Næcrogenia.

Momenta ad hunc morbum dispositiva prævalia sequentia:

1. Aetas tenerissima, infansilis, a prima dentitione usque ad aetatem secundam; et quidem ex ea causa, quod tunc temporis partes creparis solidiores, cum præcipue, cartilagineae, ligamenta nec non masculi, nondum ad illam perfectionis gradum elatae, quo partes fluidae atque molles fruantur, majorem quoque materie nutritivae copiam atque exquisitiorem requirant, et ad eundem perfectionis gradum extollantur. Quod si nunc hæc non pote quan-

lente aut qualitate suppeditatur, accedentibus causis occasionalibus facillime oritur, de quo loquimur, morbus.

1. Hereditas, licet (secundum Richter) congenita rachitis valde dubia sit.

2. Partus prematurus.

3. Generatio a parentibus laetis, pueris, decrepitis, aetate multum disparibus, phtisi, arthritide, syphilitide, scrofula, vel quocumque alio morbo exhaustis.

Hae igitur forent causae rachitidis disponentes.

Causae excitantes autem hujus morbi quolibet dici potest potentia, quae vitae plasticas opera, assimilationem, stylificationem nec non et sanguificationem perturbare, et exinde nutritionem, quae imprimis respectu partium solidarum uberius requiritur, tum quantitative tum qualitative peccantem causare valet.

Pertinent ergo hae:

1. Prae nutritionum conditio

a. Nutrimenta tenacis, glutinosa, farinacea, pinguis, viscoenta, lepida, aquosa, saccharata, leguminea et solani tubera latic costantia amylo.

b. Lac matris, nunc matricis, nunc animalium nimis apertum, vel nimis tenue, vel alia adhuc ratione peccans.

2. Aëris conditio vitiosa

Aër impurus, corruptus, frigidus, nebulosus, salacis nimis et lucis denegatus influxus pul-

mentum et cutis maneribus plurimum obstant. Nam et pulmones eam symbolum conferant ad rachitidem generandam, minorem oxygenii copiam sanguini adducendo; que fit ut idem minorem quoque totis stimulum addat, et omni-
bus organismi partibus minorem materie nutritiæ copiam subministrat, quam que ad perfectam suam evolutionem et restorationem indigent.

3. Inmundities.

4. Morbi progressi; impetigines præpripia, nec non febres intermittentes, convalscenæ, catarrhi disturi, dysenteria, hæmorrhagiæ graviores, diarrhoeæ, abusus remediæ narcotico-rum.

Omni jure autem eadem rachitidis existantibus adscribere adhuc fas est.

5. Gestari infantes in uno eodemque semper latere, sedere confuso in uno eodemque loco, et processum tentare aut nimium exercere incoasum, uti et ligationem corporculi in truncum immobilem, uti rediminas plicis non est.

Circa autorem et causam proximam hujus morbi variæ existant opiniones, plurimæque hypothese. Sic nonnulli medici credunt causam proximam esse missam; alii acrimoniam rachiticam, secundum Sællæ indolis ignotæ, secundum alios vero syphilidi anomala similem, asserunt.

Colles causam proximam possit in defectum illius materie, quæ partes solidas constitare solet.

• Juxta Secmering opinionem rachitis consistit in vita aliam locata vasorum lymphaticorum.

Non naturam hujus morbi quæritur in nutritionis qualitative et quantitative precesente defectu, atque ortum ejus explicamus ex insufficienti in canali alimentari chyficatione, et minori angulari tam ope cutis, tam in pulmonibus oxydatione. Nam eminens rachitidis character ex tantum propter in depravata musculorum, ligamentorum, cartilagineum atque osium nutritione precipue conspicuus est, quia teneri vasculos pulorum organismus solidas has partes mollioribus adhuc multo difficilius ad normam ferre et nutrire valet. Nihilominus autem etiam partes fluidas, lymphæ et sanguinis similes eandem conditionis erroris in hoc morbo participant.

Differentiæ a morbis analogis.

Utrum testamento existit morbus, quem cum rachitis commutari possit, nempe osteomalacia syphilitica, sed et huc, licet phenomenon plura adhuc simillima, nonnulla tamen dantur essentialia osteomalaciam syphiliticam, quarum defectus omne de precesente rachitide tollit dubium. Symptomata supradicta sunt: dolores atroces nocturni et tumores magis circumscripti cranio, radio et tibia media. Porro osteomalaciam syphiliticam prececit infectio; rachitidem nullatenus. In pri-

ri mercurius primum remedium, quod tamen non tam constat in rachitide, sicuti etiam in hac epiphyse magis infestantur quam reliquæ ossium partes.

Therapia.

Antequam medicus rachitidis curam adgrediatur propriam, prudens, potius noscentes ad rachitidis generum contribuentes, quantum viribus concessum, removere student. Eundem enim presentibus, sanatio frustra tentabitur, quam sanatio sola effectibus omnem remedium pervertent virtutem sanantemque reddant, quam e contra, eundem remota, ipse morbus non raro sola vi mediatricis naturæ sanatur.

Erit ergo prima indicatio: causas morbi amovendi, cui optime satiat per dietam naturæ rachitidis adequantur.

Aër proinde sit purus, siccus, moderate calidus; ventus minime angustus, siccus, caloremque ferat, imo et levis eandem habeat datus; consistat nempe ex hypostomatibus aëre equine confectis, sicut sub moto horizontalis omni alii præferatur; matri commendandum ne infans dum uno eodemque semper circumferat brachio, sed modo dextero, modo sinistro; aculei provocatores vehantur in orem, motus concedantur liberi, exponantur infantes insolationi et ferantur arena calefacta. Summus respu-

etiam habentur munditiei, tandem et cultura mentis aequali passo cum restoratione valetudinis corporis inchoare debet. Quoad victum monendum, ut nonnulli alimentis abster infans, quibus suscitandis per est, ita quidem et primo aut mater aut sana nutrix ubum praestet, donec et alias et quidam solidior concedi possit victus quem ex cibis animalibus potius deprimet, erigendo omnia acida, pinguis, legumines et glutinosae substantiae etc. potus optimus aqua, lacte, juscula carnea, nec non aqua cum panis rini remista.

Haec sunt, quae diaetetica ad morbum sanandum conferant; tantique haec certe momenti ut si in aetate constas, progrediente aetate, morbo limites ponendi adjoventur, tamplurimum feliciter succedat eventus.

Causa domum remotis, therapia in eo consistit ut qualitas prava reproductionis organice excutatur et animalitatis, quatenus et haec imperfecte evoluta esse videtur, promoveatur, ut major fiat humorum transitus per vasa minima. Illico omnia medicamina tam interna tum externa in usum vocanda veniunt, quibus via inest partim actionem systematicam lymphaticam excitandi, partim vero aetate et indurationes ejusdem amovendi. Digestionis naturae officinam respiciens in rheumaticis medicas, majorem substantiarum a vita alienarum, quae stimulo suo peregrino non tantum digestionis, sed et reliquarum functionum turbas

producenti, quantitatem, modo majorem invenit copiam acidi in tubo intestinali, effectus non minus perniciosos excretis.

Præquam igitur cura propela rheobitida cum remedia super laudatis laudatur medicina, digestionalis officinam ab his substantiis, cœci vitæ infernalis, liberare tentans, alterum in finem ordinabile purgantis dum alterius remotionem absorbentibus efficere conabitur.

Inter purgantis eminent: rheum (syraps cichorii cum rheo) senna (aqua laxativa, hydromel infantum, syrops foliorum senne) jalappa et aloë, si adeat torpor intestinalium optime junguntur cum liquore terre foliatæ tartari, liquore coram cerri succinato, linctura corticem aurantiorum etc; præsertim vero helminthias, hydrægyrum maritimum salta aliæque vermifuge in usum vocantur.

Inter absorbentia, simulque secretiones corrigentia eliguntur: magnesia usta et carbonica; liquor Rûissæ carbonicæ et aqua; aqua calcaris carbonicæ, ex quibus priora cum purgantibus super enumeratis lentissimè conjunguntur.

Secunda igitur indicatio erit: cujuscunque generis acides et acida, sive sint morbi prægravi reliquias sive præsentis effectus, primitus et sub alio quocunque tractamine regenerata, nocitas pellendi et destruendi. Causa demum morbum producentibus remota, cordibusque nec non acido eliminatis, tertia respici-

cienda resit indicatio: in productionem nempe organicam valenter agendo, simulque formationes ita dirigendi ut materia organica indolis et quantitatis debita produceretur, ut prout solidis partibus firmitas, fluidis plasticitas, utriusque major energiae vitalis gradus consequatur. Indicata igitur crux primo: sobrietas stimulantia, antimonialis, hydragyrea, vel sola vel in consorcio cum narcoticis. Remanenti tunc digestionis languori, chylopoesi morbidae, assimilationi languenti, debilitati musculari optime medditur apparatus remedium roborentium americanum; sed ex hoc, uti ex quavis alio medicaminum genere, semper mitiora ab initio eligenda et demum sensim ad efficaciora transgrediendum. Hinc ab initio praeparata rhei, fel tauri, radia gentianae, colombo, cortex quassiae, septa aromatica, uti: calamo aromatico, cortici cinnamomi, nuci moscatae, baccis lauri, corticibus aurantiorum etc.

Atoniae systematis irritabilis et habitui morbozo optime sequentis opponuntur: glandulae totae quercus, infusum vel decoctum radicis caryophyllatae, cinchonacea et tandem martialis, incipiendo eum tinctura martis permixta, rursus martiata, ferribus salis ammoniaci martialibus, denique transgrediendo ad efficaciores, sicuti limaturam ferri et ejus sulphatem.

Mentio adhuc facienda trium medicaminum radicis nempe rubrae tinctorum, radicis

lepti et acidi phosphorici diluti; sed quadris horum, contra hanc gravem morbum in usum tractum, raro sufficere compertum habemus.

Complicatio hujus morbi cum acrofula vindi-
diat cum alcalum fixorum, saponis medici-
nalis, fixarum et sodas acetice, barytas maria-
ticae, cupri, ononidis, dulcamaras etc., in gene-
re methodum solventem simulque rari lymphati-
ca stimulantem.

Superest adhuc quarta indicatio, eaque sum-
mi momenti, cuius nempe functionem normalem
restituendi, huiusque indicationi optime assidit
per curam (sic dictam) externam, quae praeci-
pue tunc in usum vocatur si cum debilibus,
qui non ferant, aut cum pertinacibus, qui re-
sistant ore ingerenda medicos agendum.

Ad hanc curam nunc spectant; balnea, la-
vices, perfusiones, inunctiones, usus aromas
causticae, thermae stercis etc.

Balnearum salubrem in rachitide cum
plurimi laudant medici, et quidem balnearum
substantiis aromaticis, salibus alcalinis vel etiam
fero gravium. Favente autem nannia tempe-
ratis, caelestque aere sunt adhibenda, necnon
melius conducit aegros vici aut vici spiritus
aqua dilutis, meris, aromatis vel camphora im-
pregnatis lavari, et pannis, fumo aetherico (ju-
niperi, menthae, myrrhae, styracis) imbutis
sedule perficari.

. Linimenta et inunctiones abundantes et

roborentes, et quaecunque aliae, ab auctoribus laudatae, oculi infantem minus convalescant.

Quod si sub decursu oriantur oculum inflammationes, sub epinae tentoriae aut podarthrocaele forma comparantes, quae topica non nisi remediis non concedunt, therapia antiphlogistica in usum trahitur; adhaerentur parti affectae hirudines, cataplasmata emollientia, vesicantia, unguentum cinereum, vel aliquod linimentum volutiter stimulant; quibus autem non sufficientibus, adpiceatur lentisuli, et ultimo cauterium tentare licet. Laudatur hic etiam acidum phosphoricum, decento quodam tonico exceptum, et ulceribus fistuloso-cariculis cylindrum injectum.

In tollendis deformitatibus et incurvationibus ars per se valet, et quod praestare potest, tantum per osideum machinarum chirurgicarum usum praestet, quarum uberius expositio ad forum Chirurgiae pertinet. Quoad curam prophylacticam haec solum restringitur ad fugam omnium momentarum casualium, quae rachitidis evolutioni quam maxime favent, nec non ad eam eorum remedium, quae efficiuntur vitali aetate adiungunt vigorem.

Prognosis.

- * Rachitis quidem non adeo infensa est vitae ipsae, sed relinquit interdum deformitates, quae per integram vitam durant. In genere in

statuenda rachitidis prognosi, medicum non tantum momenta causalia sed et ætatem, gradum morbi nec minus conditiones vitæ, sub quibus aeger versatur, sicuti morbos rachitidi subsecutos coram habere oportet.

Triste presagium est: si morbus infantes terribissimos corripit, si gradus morbi est gravior, si fracta naturæ via medicatrix non sufficit ad promovendam bonam ætatem, si morbus jam ultra quintam ætatem durat, et per hereditariam dispositionem inductus erit, denique si alii adhuc morbi superveniunt.

Rachitis e contra non multum limites transgressa, sub bona adhuc constitutione infantili, si modica et diutius congrua in exordio morbi jam non fuit neglecta, neque circumstantiæ alie feroces accedunt; rachitis ab ætate aut victus solummodo vitio orta, variolâ aut scabie, aut aliis ætate efflorescentiis subsequas habens, nec cum tanta animum spinæque duri insurrectione et motus impotentia conjuncta, faciliorem recipit modicum; imo lentissime in sanitatem terminatur.

THESES DEFENDENDÆ



1. *Quandā infans a matre sine lactatur, nec aliis simul nutrimentis abutitur, non fit rhachitis.*

2. *Organica functio quæ in utroque sexu generationi præstat est secretio.*

3. *Graviditas status pñlogosi physiologici similis censendus.*

4. *Antidota quæ in reſpectu chemico virtutem agunt nullius ferme utilitatis sunt.*

5. *Fœmula nimis conplexa debium de ſimilitudine diſtinguere non potest.*

6. *Auditis hallucinationes faciles ac illas rursus ad veritatem ducunt.*

7. *Medicus nil ſaciendo optimum novum quærit.*

8. *Virus dare difficile, facile adinere.*

9. *Auxilia therapeutica, quæ bene cum succura in rhachide adhibentur, illius indolem inflammatoriam perſpicue declarant.*

10. *Remedia anticholinica, quæ frequentius adhibentur æſpiratione morbum exasperare valent.*



